



FONDAZIONE  
ITALIANA  
SINDROMI  
MIELODISPLASTICHE



# ***CENSIMENTO PAZIENTI CON SINDROME MIELODISPLASTICA***

***RETE FISiM 2019***

- **REGISTRO FISiM.** Include 6309 pazienti con MDS inseriti nel periodo 2011-2018. 315 nuovi casi sono stati inseriti nel 2019
- **ETA'.** L'età mediana alla diagnosi è di 77 anni.
- **COMORBIDITA'.** Nel 68% dei casi è presente almeno una comorbidità: patologie cardiovascolari (31%), respiratorie croniche (14%), insufficienza renale cronica (11%), epatopatie croniche (9%), pregresso tumore (14%).
- **LA DIAGNOSI.** Il 70% dei casi è diagnosticato in una fase precoce di malattia, mentre la malattia è avanzata nel il 30% dei casi.
- Le MDS con sideroblasti ad anello, per le quali EMA ha recentemente approvato un nuovo farmaco per il trattamento dell'anemia (luspatercept) rappresentano il 16% dei casi totali

## ***LA PRESENTAZIONE CLINICA***

- Alla diagnosi, la più frequente citopenia nel sangue periferico è stata l'anemia (93% dei pazienti), di grado severo (ovvero richiedente supporto trasfusionale) nel 23% dei casi.
- Durante il corso della malattia, quasi la totalità dei pazienti (se non adeguatamente trattati) sperimentano una anemia trasfusione-dipendente.
- Una evoluzione leucemica si verifica nel 21% dei pazienti

## ***TRATTAMENTI***

- Epoetina ricombinante 51%
- Lenalidomide 2,5%
- Farmaci ipometilanti 20%
- Chemioterapia ad alte dosi 1%
- Trapianto allogenico 3,3%
- Studio clinico sperimentale 3,7%